



Trinkanleitung für Eziclen

5 Tage vorher bitte keine körnerhaltigen Produkte essen: z.B. Müsli, Körnerbrot oder Körnerbrötchen, Tomaten, Kiwi, Weintrauben o. ä. essen.

UNTERSUCHUNG am Untersuchungstag um Untersuchungszeit Uhr.

Am **V O R T A G** ist ein kleines, leichtes Frühstück bis 10.00 Uhr erlaubt.

Anschließend bitte nur noch **stilles Wasser, klaren Apfelsaft, klare Brühe oder hellen Tee trinken**. **.Bitte nichts mehr essen!!!!**

Gießen Sie am **VORTAG** um **15:00** h den Inhalt einer Flasche Eziclen in den Becher. Fügen Sie danach Wasser bis zur Markierung am Becher hinzu.

Trinken Sie bitte portionsweise innerhalb einer Stunde die gesamte Flüssigkeit aus.

Im Anschluss daran den Nachmittag und Abend über noch **mindestens weitere 1,5 bis 2,0 Liter** von den erlaubten Getränken nach und nach hinterher trinken.

Am **Untersuchungstag** um **Untersuchungszeit** h die **2. Flasche Eziclen** mit Wasser im Meßbecher anrühren und wieder portionsweise innerhalb einer Stunde auftrinken.

Im Anschluss daran bitte mindestens **1,0 Liter stilles Wasser oder Tee** hinterher trinken, bis Sie nur noch eine klare, gelbliche Flüssigkeit ausscheiden.
Versuchen Sie möglichst in den letzten 2 Stunden keine großen Trinkmengen mehr zu sich zu nehmen.

Tipps zur Einnahme:

Medikament vor der Einnahme kühlen - mit einem Strohhalm trinken.
Im Wechsel schluckweise Eziclen und Wasser trinken.
Sie dürfen jederzeit Traubenzucker zu sich nehmen.

Bitte beachten Sie:

- Ganztägige Fahruntauglichkeit nach der Untersuchung
- Am Untersuchungstag nicht rauchen
- Beeinträchtigung der Antibabypille
- Am besten tragen Sie zur Untersuchung eine Jeanshose.

WICHTIGER HINWEIS: Ihre Abholung muss Sie in der Praxis im AUFWACHRAUM abholen